





RECOMENDAÇÕES DE VACINAÇÃO

Algumas doenças estão amplamente disseminadas ou de difícil erradicação e requerem um programa rotineiro de vacinação. Em geral, todos os lotes devem ser vacinados contra Doença de Marek, Doença de Newcastle (NDV), Bronquite Infecciosa (IBD), Doença de Gumboro (IBD), Encefalomielite Aviária (AE) e Bouda Aviária. Outras vacinações podem ser incluídas no programa vacinal de acordo com o desafio sanitário local.


Um único programa não pode ser recomendado para todas as regiões. Siga as instruções fornecidas pelo fabricante das vacinas. Use apenas vacinas certificadas. Consulte um médico veterinário para determinar o melhor programa vacinal para sua região.

PROGRAMA BÁSICO PARA VACINAÇÃO DE POEDEIRAS COMERCIAIS




 Vacinas vivas aplicadas no incubatório, via subcutânea

 Vacinas vivas, administradas por inoculação na membrana da asa

 Vacina vivas administradas via água de bebida, spray ou gota ocular


 Vacinas inativadas, aplicadas via intramuscular ou subcutânea

PROGRAMA BÁSICO PARA VACINAÇÃO DE POEDEIRAS COMERCIAIS (CONTINUAÇÃO)




OPÇÕES DE APLICAÇÕES DE VACINAS PARA POEDEIRAS COMERCIAIS

Utilize caso essas doenças sejam prevalentes na região. Siga as instruções fornecidas pelo fabricante. Use apenas vacinas certificadas. Consulte o Médico Veterinário para estabelecer o melhor programa vacinal para sua granja.



OPÇÕES DE APLICAÇÕES DE VACINAS PARA POEDEIRAS COMERCIAIS (CONTINUAÇÃO)



■ Vacinas vivas aplicadas no incubatório, via subcutânea

■ Vacinas vivas, administradas por inoculação na membrana da asa


■ Vacinas vivas administradas via água de bebida, spray ou gota ocular

■ Vacinas inativadas, aplicadas via intramuscular ou subcutânea

VACINAS HVT RECOMBINANTES

As vacinas vetorizadas recombinantes oferecem a conveniência de serem aplicadas no incubatório sem os efeitos adversos de uma vacinação a campo. Para uma melhor proteção para a Doença de Marek use a Vacina Rispens com a vacina recombinante HVT.

ATENÇÃO: Não use outra cepa de HVT, junto com vacinas HVT recombinante.



Vacinas vivas aplicadas no incubatório, via subcutânea



Vacinas vivas, administradas por inoculação na membrana da asa



Vacinas vivas administradas via água de bebida, spray ou gota ocular



Vacinas inativadas, aplicadas via intramuscular ou subcutânea



Hy-Line International | www.hyline.com

