

8 CONSEILS POUR MAINTENIR LES OISEAUX À L'INTÉRIEUR


L'élevage en plein air est une pratique courante dans de nombreuses exploitations en Europe. Bien que cette pratique soit optimale pour le bien-être et le comportement des poules, le plein air s'accompagne d'un risque accru d'exposition aux maladies.

Face à une menace de grippe aviaire ou d'une autre maladie aviaire majeure, il peut être nécessaire de garder les oiseaux à l'intérieur pendant un certain temps. Cela peut sembler facile, mais le confinement des oiseaux implique un certain nombre d'enjeux. Voici huit conseils pour assurer le confort et la productivité des oiseaux pendant le confinement :



1. LES NIVEAUX DE LITIÈRE doivent être suffisants pour permettre aux oiseaux de satisfaire leur besoin de gratter et de prendre des bains de poussière. L'utilisation d'une trop grande quantité de litière peut conduire les poules à pondre des œufs sur le sol.

2. LA QUALITÉ DE LA LITIÈRE doit être surveillée. L'humidité est un élément clé de la qualité de la litière, la litière humide doit être retirée et remplacée pour éviter l'accumulation d'ammoniac. Elle ne doit pas être trop sèche, car les conditions poussiéreuses peuvent provoquer des problèmes respiratoires et propager des agents pathogènes.




3. LA VENTILATION MINIMALE doit être suffisante pour fournir aux oiseaux un air de qualité à tout moment.

4. MARCHEZ régulièrement dans la zone de litière pour vous assurer que les oiseaux ne s'y entassent pas, en particulier derrière les trappes.



5. Il est recommandé d'ajouter des **ENRICHISSEMENTS** comme des balles de luzerne ou des jouets.

6. L'INTENSITÉ LUMINEUSE ne doit pas dépasser 30 lux et peut être réduite pour calmer le troupeau si nécessaire. Veillez à une distribution uniforme de la lumière dans tout le poulailler. Les zones sombres, autres que les zones de nidification, doivent être évitées.



7. L'ALIMENTATION doit être gérée en fonction des éléments suivants :

a) Les fibres ont un effet positif sur la satiété et la fonction intestinale en stimulant l'activité du gésier. Des niveaux plus élevés de fibres peuvent être bénéfiques pour les oiseaux confinés, car ils peuvent augmenter le temps d'alimentation et réduire l'ennui.

b) La taille des particules d'aliments est importante sur le plan nutritionnel et incite les poules à adopter un bon comportement alimentaire. Utilisez le profil granulométrique de l'aliment Hy-Line et veillez à ce que la taille des particules soit comprise entre 1 et 3 mm.

c) La teneur en nutriments de l'aliment doit être basée sur les besoins nutritionnels de l'oiseau et sa consommation d'aliments. Une estimation précise de la consommation d'aliment est importante pour fixer le niveau de spécification des nutriments.

Rappelez-vous : les oiseaux mangent des quantités de nutriments, pas des pourcentages !

8. FAITES DE LA PRÉVENTION Toutes les maladies habituellement présentes sont exacerbées par le stress du confinement. Mettez à jour le programme de vaccination de vos oiseaux et focalisez-vous sur les points ci-dessus pour la gestion de l'environnement afin de garder les oiseaux en bonne santé.



Pour toute aide supplémentaire, veuillez contacter votre représentant Hy-Line local.

Les directives de gestion sont disponibles sur hyline.com.



Hy-Line International | www.hyline.com

