




VACCINAZIONI RACCOMANDATE

Alcune malattie sono molto diffuse e di difficile eradicazione. Di conseguenza si rende necessario eseguire un programma di vaccinazioni adeguato. Di norma tutti i gruppi di galline ovaiole devono essere vaccinati per la malattia di Marek, la malattia di Newcastle (NDV), la bronchite infettiva (IB), la malattia di Gumboro, l'encefalomielite aviare (AE) e il vaiolo.

Non è possibile elaborare un unico programma vaccinale valido per tutte le regioni. È buona norma seguire le indicazioni del fabbricante dei vaccini, utilizzare soltanto vaccini approvati, e consultare un veterinario locale per stabilire il programma vaccinale più adatto.

VACCINI FONDAMENTALI PER GALLINE OVAIOLE COMMERCIALI




Vaccini vivi in incubatoio, somministrare per via sottocutanea

Vaccini vivi, somministrare in acqua da bere, in spray o gocce oftalmiche

Vaccini vivi, somministrare attraverso inoculazione all'ala


Vaccini inattivati, iniettare per via intramuscolare o sottocutanea

VACCINI FONDAMENTALI PER GALLINE OVAIOLE COMMERCIALI (CONTINUAZIONE)





VACCINI OPZIONALI PER GALLINE OVAIOLE COMMERCIALI

Eseguire queste vaccinazioni nel caso vi sia un'elevata pressione della patologia nella zona. Seguire le indicazioni del fabbricante dei vaccini. Utilizzare soltanto vaccini approvati. Consultare un veterinario locale per stabilire il programma vaccinale più adatto.




VACCINI OPZIONALI PER GALLINE OVAIOLE COMMERCIALI (CONTINUAZIONE)



VACCINI HVT RICOMBINANTI

I vaccini che usano vettori ricombinanti offrono la convenienza della somministrazione in incubatoio senza gli effetti indesiderati causati da alcuni vaccini vivi di campo. Il vaccino Rispens in combinazione con il vaccino HVT ricombinante offre la migliore protezione contro la malattia di Marek.

AVVERTENZA: Non somministrare un vaccino HVT insieme ad altri vaccini del vettore HVT.



	<i>Vaccini vivi in incubatoio, somministrare per via sottocutanea</i>		<i>Vaccini vivi, somministrare attraverso inoculazione all'ala</i>
	<i>Vaccini vivi, somministrare in acqua da bere, in spray o gocce oftalmiche</i>		<i>Vaccini inattivati, iniettare per via intramuscolare o sottocutanea</i>



Hy-Line International | www.hyline.com

