

Hy-Line Brown Max Technical Tips

Hy-Line
BROWN MAX



PT Hy-Line Layers Indonesia Technical Bulletin #1, September 2023

This month, Dr. Santana highlights the importance of good on-farm vaccination. Here are some tips that could save you money and help your birds!



Very important: Simpan vaksin pada kulkas yang berfungsi dengan baik dan terhindar dari matahari langsung.

Cek tanggal expired date penyimpanan secara FIFO disarankan. Suhu penyimpanan 4–8°C tidak boleh beku.

Pastikan menghandling vaksin dengan benar untuk menghindari kontaminasi. Siapkan vaksin dan alat vaksin secara aseptis sebelum pemakaian. Setelah penggunaan vaksin pastikan alat vaksin disterilisasi menggunakan alkohol 70% disimpan pada tempat yang bersih dan kering.



Pada saat vaksinasi wajib memegang ayam secara benar agar ayam tidak terluka dan proses vaksinasi berjalan dengan baik. Pegang ayam pada sayap atau kaki untuk menghindari ayam mengepakkan sayap.

Subcutan atau Intermuscular, ayam harus dihandling dengan baik siapkan alat atau alas agar ayam berada posisi yang nyaman untuk divaksin lakukan vaksinasi secara baik dan benar hindari menyuntik organ dalam.

Tip: Ganti jarum setiap 500 ekor untuk menghindari luka pada otot.

Bagaimana cara mengetahui bahwa ayam sudah tervaksinasi secara baik dan tepat? ada beberapa metode:

- ✦ Menggunakan pewarna Dyne pada sayap atau kulit atau mata
- ✦ A1Vaksinasi di hatchery menggunakan IRBT atau mesin vaksinasi
- ✦ Dan monitoring mengevaluasi titer 3-4 minggu pasca vaksinasi.



For more information, contact Dr. Santana:

+62 81 836 8019

santana@hyline.com